

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
11.04.2015 № 229
Реєстраційне посвідчення
№ СUA/10638/01/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу
ГЛОДУ НАСТОЙКА

Склад:

діюча речовина: 1 флакон містить глоду плодів настойки (1:10) (екстрагент: етанол 70 %) 25 мл або 50 мл, або 100 мл;
допоміжні речовини (крім екстрагенту): відсутні.

Лікарська форма. Настойка.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина від жовтого до коричневого з оранжевато-червонуватим відтінком кольору зі специфічним запахом. Допускається утворення невеликого осаду.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються у кардіології. Код ATХ C01E B04.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Біологічно активні речовини, що містяться у плодах глоду (флавоноїди, холін, ацетилхолін, дубильні речовини, фітостерини, тритерпенові кислоти) посилюють кровообіг у коронарних судинах і судинах головного мозку, підвищують чутливість міокарда до серцевих глікозидів і зменшують його збудливість, що призводить до певного посилення спорочень серцевого м'яза.

Фармакокінетика.

Препарат добре всмоктується при прийомі внутрішньо. Ефект настає через 30 хвилин – 1 годину.

Клінічні характеристики.

Показання.

Функціональні розлади діяльності серцево-судинної системи (нейроциркуляторні дистонії), а також як допоміжний засіб при легких формах порушень серцевого ритму (миготлива аритмія, пароксизмальна тахікардія).

Протипоказання.

Індивідуальна непереносимість компонентів препарату, виражена форма артеріальної гіпотензії, брадикардія.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Препарат потенціює дію антиаритмічних засобів, тосилює ефекти серцевих глікозидів, снодійних, седативних, гіпотензивних засобів. Прийом із сочками алкалоїдів не рекомендується у зв'язку з можливістю утворення негативних комплексів. Не слід застосовувати препарат разом із цизапридом. У разі необхідності одночасного застосування будь-яких лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.

Особливості застосування.

Препарат не рекомендується приймати під час їди, щоб уникнути взаємодії з компонентами їжі.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Не застосовувати у період вагітності або годування груддю, оскільки до складу препарату входить етанол.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Препарат містить етанол і може спричинити сонливість, тому у період його застосування слід утримуватися від керування автотранспортом або роботи з потенційно небезпечними механізмами.

Способ застосування і дози.

Приймати внутрішньо до їди. Дорослим рекомендується приймати по 20 крапель настойки, дітям віком від 12 років – із розрахунку 1 крапля на 1 рік життя 3 рази на день до досягнення стабільного лікувального ефекту (нормалізація артеріального тиску, зменшення серцевиття). Тривалість лікування визначається індивідуально.

Діти.

Не застосовувати дітям віком до 12 років у зв'язку з тим, що препарат містить етанол.

Передозування.

При значному перевищенні дози можливе виникнення сонливості, брадикардії, зниження артеріального тиску, що вимагає припинення прийому препарату і проведення симптоматичної терапії.

Побічні реакції.

Рідко спостерігаються сонливість, значне зниження серцевого тиску, алергічні реакції (у т. ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри).

У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату і обов'язково звернутися до лікаря.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C. Під час зберігання можливе випадання осаду.

Упаковка. По 25 мл або 50 мл, або 100 мл у флаконі у коробці або без вкладання у коробку.

Категорія відпуску. Без рецептів.

Виробник. ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22.

Дата останнього перегляду.

Година согласовано
3.10.14

